



1770

De partitione numerorum in partes tam numero quam specie datas

Leonhard Euler

Follow this and additional works at: <https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works>

 Part of the [Mathematics Commons](#)

Record Created:

2018-09-25

Recommended Citation

Euler, Leonhard, "De partitione numerorum in partes tam numero quam specie datas" (1770). *Euler Archive - All Works*. 394.
<https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/394>

This Article is brought to you for free and open access by the Euler Archive at Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Euler Archive - All Works by an authorized administrator of Scholarly Commons. For more information, please contact mgibney@pacific.edu.

DE PARTITIONE NUMERORVM

IN PARTES TAM NUMERO QVAM
SPECIE DATAS.

Auctore

L. E V L E R O.

I.

Cum olim tractauissem problema de partitione numerorum, quo quaerebatur, quot variis modis datus numerus in duas, vel tres, vel quatuor vel generatim in tot partes, quot quis voluerit, discerni possit, id potissimum curavi, vt in eius solutione nihil quicquam inductioni, cuius vsus plerumque in huiusmodi problematibus soluendis solet esse frequentissimus, tribuerem. Acque methodus, qua sum vsus, ita videtur comparata, vt etiam ad alia problemata aequo successu adhiberi possit, id quod vulgatissimo illo problemate, quo quaeri solet, quot modis datus numerus dato tesserarum numero proici possit, eo quidem amplissime extenso hic ostendere constitui.

2. Quando autem quaeritur, quot modis datus numerus N datum tesserarum numerum n proiciendo cadere possit, quaestio huc redit, quot variis

DE PARTIT. NUMEROR. IN PARTES. 169

riis modis datus numerus N in n partes resolui possit, quarum singulae sint vel 1, vel 2, vel 3, vel 4, vel 5, vel 6, siquidem facies tesserarum his numeris sint indignitae. Ex quo nascitur haec quaestio latius patens, quot variis modis datus numerus N diuidi possit in n partes, quarum singulae sint vel α , vel β , vel γ , vel δ etc. quorum numerorum α , β , γ , δ etc. multitudo sit pariter data puta $=m$; ita vt partes; in quas datus numerus sit resolendus tam numero quam specie dentur.

3. Concipiantur scilicet eiusmodi tesserae, quae non vt vulgo sex, sed m habeant facies seu hedras, ita vt in singulis hae facies notatae sint numeris α , β , γ , δ etc. atque iam quaeritur, si habeantur n huiusmodi tesserae, quot modis iis proiciendis datus numerus N produci possit. Possent etiam tesserae inter se dispares assumi, ita vt singulae peculiarem haberent hedrarum numerum, quae etiam in singulis peculiaribus numeris sint inscriptae; verum ex iis quae de tessertis vulgaribus sum allaturus, etiam solutio huius quaestionis latissime patetis haud difficulter colligetur.

4. Numeros autem, quibus facies tesserarum sunt notatae, tanquam exponentes quantitatis cuiusdam x considero, ita vt pro tessera vulgaris hanc habeamus expressionem $x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$, etc. vbi cuique potestati unitatem pro coefficiente tribuo, quandoquidem quilibet numerus exponente designatus

Tom. XIV. Nou. Comm. Y aequae

aeque facile cadere potest. Quodsi iam huius expressio- nis quadratum sumatur, quaevis potestas ipsius, x tantum recipiet coefficientem, qui indicet quot modis ea potestas ex multiplicatione binorum terminorum istius expressio- nis resultare, hoc est, quot modis eius exponens ex additione binorum numero- rum ex ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6 produci possit. Evolutio ergo nostrae expressio- nis quadrato, si in eo occurrat terminus Mx^N , inde colligitur nume- rum N binis testibus iaciendis tot modis prodire, quot cœfficiens M contineat unitates.

5. Simili modo evidens est, si istius expressio- nis sumatur cubus $(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^3$, in eius evolutione quamvis potestatem x^N toties occurrere, quot modis eius exponens N oriri potest addendis tribus numeris ex ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6; unde si huius potestatis cœfficiens sit M , totusque terminus Mx^N , ex eo concludimus numerum N tribus testibus iaciendis tot modis produci posse, quot cœfficiens M contineat unitates. Generatim ergo si sumatur exponentis n dignitas nostrae ex- pressionis $(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^n$, ea evoluta secundum potestates ipsius x , quilibet terminus Mx^N docebit, si numerus testierum fuerit $= n$, his iaciendis numerum N tot modis cadere posse, quot cœfficiens M contineat unitates.

6. Si ergo testierum numerus fuerit $= n$, quaeraturque quot modis datus numerus N his proi-

proiciendis cadere possit, quaestio resolvetur per evolutionem huius formulae $(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^n$, cuius cum primus terminus futurus sit x^n , ultimus vero x^{6n} , prodibit huiusmodi terminorum progressio:

$$x^n + Ax^{n+1} + Bx^{n+2} + Cx^{n+3} + \dots + Mx^N + \dots + x^{6n}$$

cuius quilibet terminus Mx^N offendet numerum N exponenti aequalem tot modis cadere posse, quot cœfficiens M contineat unitates: ex quo statim elucet, quaestionem locum habere non posse, nisi numerus propositus N contineatur intra limites n et $6n$. Totum ergo negotium hac re- dit, ut ista progressio seu singulorum terminorum cœfficiences assignentur.

7. Ad hos igitur inveniendos ponatur formula evolvenda hoc modo representata

$$x^n(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)^n = V$$

tum vero pro eiusdem evolutione statuatür $V = x^n(A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + Fx^5 + \text{etc.})$

Ac posito $\frac{V}{x^n} = Z$ erit ex priori differentiale logarithmicum:

$$\frac{x dZ}{Z dx} = \frac{n(x+x^2+x^3+x^4+x^5)^{n-1}(1+2x+3x^2+4x^3+5x^4)}{1+x+x^2+x^3+x^4+x^5}$$

Eiusdem autem valor ex posteriori prodit

$$\frac{x dZ}{Z dx} = \frac{Ax + Bx^2 + Cx^3 + Dx^4 + 5Ex^5 + 6Fx^6 + \text{etc.}}{1 + Ax + Bx^2 + Cx^3 + Dx^4 + 5Ex^5 + 6Fx^6 + \text{etc.}}$$

Y 2

quae

quae duae expressiones inter se debent esse aequales, unde coefficientium valores determinabuntur

8. Constituta autem harum duarum expressio- num aequalitate oritur ista aequatio

$$\begin{aligned} & nx + nAx^2 + nBx^3 + nCx^4 + nDx^5 + nEx^6 + nFx^7 + nGx^8 \text{ etc.} \\ & + 2n + 2nA + 2nB + 2nC + 2nD + 2nE + 2nF \\ & + 3n + 3nA + 3nB + 3nC + 3nD + 3nE \\ & + 4n + 4nA + 4nB + 4nC + 4nD \\ & + 5n + 5nA + 5nB + 5nC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = Ax + 2Bx^2 + 3Cx^3 + 4Dx^4 + 5Ex^5 + 6Fx^6 + 7Gx^7 + 8Hx^8 \\ & + A + 2B + 3C + 4D + 5E + 6F + 7G \\ & + A + 2B + 3C + 4D + 5E + 6F \\ & + A + 2B + 3C + 4D + 5E \\ & + A + 2B + 3C + 4D \\ & + A + 2B + 3C \end{aligned}$$

quae binae expressiones, cum secundum singulos terminos inter se debeant esse aequales, valores sin- gulorum coefficientium suppediabant.

9. Hinc autem sequentes determinaciones im- petrantur,
- A = n
 - 2B = (n-1)A + 2n
 - 3C = (n-2)B + (2n-1)A + 3n
 - 4D = (n-3)C + (2n-2)B + (3n-1)A + 4n
 - 5E = (n-4)D + (2n-3)C + (3n-2)B + (4n-1)A + 5n
 - 6F = (n-5)E + (2n-4)D + (3n-3)C + (4n-2)B + (5n-1)A
 - 7G = (n-6)F + (2n-5)E + (3n-4)D + (4n-3)C + (5n-2)B
 - 8H = (n-7)G + (2n-6)F + (3n-5)E + (4n-4)D + (5n-3)C
- etc.

Quili-

Quilibet ergo coefficientis determinatur per quinos praecedentium, quibus inuentis erit

$$V = x^n + Ax^{n+1} + Bx^{n+2} + Cx^{n+3} + Dx^{n+4} + Ex^{n+5} + \text{etc.}$$

sicque problema de n tesseris in genere est solutum.

10. Si a qualibet superiorum aequationum praecedens subtrahatur, obtinebuntur sequentes deter- minaciones multo simpliciores:

- A = n
 - 2B = nA + n
 - 3C = nB + nA + n
 - 4D = nC + nB + nA + n
 - 5E = nD + nC + nB + nA + n
 - 6F = nE + nD + nC + nB + nA + 5n
 - 7G = nF + nE + nD + nC + nB - (5n-1)A
 - 8H = nG + nF + nE + nD + nC - (5n-2)B
- etc.

Si denno differentiae caperentur, relationes istae ad- huc simpliciores fient proditurae, hoc modo

- 2B = (n+1)A; 3C = (n+2)B; 4D = (n+3)C; 6E = (n+4)D;
 - 6F = (n+5)E - 6n; 7G = (n+6)F - (6n-1)A + 5n
 - 8H = (n+7)G - (6n-2)B + 5n-1)A.
 - 9I = (n+8)H - (6n-3)C + (5n-2)B
 - 10K = (n+9)I - (6n-4)D + (5n-3)C
- etc.

11. Hinc prout referarum numerus fuerit vel 2, vel 3 vel 4 lex progressionis coefficientium erit ut legitur:

| pro duabus | pro tribus | pro quatuor |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| A = 2 | 3 | 4 |
| 2B = 3A | 4A | 5A |
| 3C = 4B | 5B | 6B |
| 4D = 5C | 6C | 7C |
| 5E = 6D | 7D | 8D |
| 6F = 7E - 12 | 8E - 18 | 9E - 24 |
| 7G = 8F - 11A + 10 | 9F - 17A + 15 | 10F - 23A + 20 |
| 8H = 9G - 10B + 9A | 10G - 16B + 14A | 11G - 22B + 19A |
| 9I = 10H - 9C + 8B | 11H - 15C + 13B | 12H - 21C + 18B |
| 10K = 11I - 8D + 7C | 12I - 14D + 12C | 13I - 20D + 17C |
| 11L = 12K - 7E + 6D | 13K - 13E + 11D | 14K - 19E + 16D |
| 12M = 13L - 6F + 5E | 14L - 12F + 10E | 15L - 18F + 15E |

etc.

quilibet ergo coefficientis per tres precedentes determinatur ubi hoc imprimis est notatu dignum, quod tandem in nihilum abeant, et postremi primis evadant pures, id quod ex hac lege minus perspicere licet.

12. Quo autem hanc legem clarius intelligamus denotet haec formula $(N)^{(n)}$ numerum casuum quibus numerus N per n referas produci potest, ita ut sit $(n) = 1; (n+1) = A; (n+2) = B; (n+3)$

$(n+3) = C; (n+4) = D; \dots (n+9) = I$ et $(n+10) = K$. Hinc ergo fiet

$$10(n+10) = (n+9)(n+9) - (6n-4)(n+4) + (5n-3)(n-3)$$

unde concluditur fore in genere:

$$\lambda(n+\lambda) = (n+\lambda-1)(n+\lambda-1) - (6n+6-\lambda)(n+\lambda-6) + (5n+7-\lambda)(n+\lambda-7)$$

Ponamus iam $n+\lambda = N$ ut sit $\lambda = N-n$, eritque

$$(N)^{(n)} = \frac{(N-1)(N-1)^{(n-1)} + 7n + 6 - N)(N-6)^{(n)} + (6n+7-N)(N-7)^{(n)}}{N-n}$$

ubi notandum est semper fore $(P)^{(n)} = 0$, si fuerit $P < n$.

13. Facilius autem hi coefficientes defini possunt pro quouis referarum numero, si iidem pro referarum numero unitate minore iam fuerint reperi. Si enim sit

$$(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^n = x^n + Ax^{n+1} + Bx^{n+2} + Cx^{n+3} + Dx^{n+4} + \text{etc.}$$

ponaturque

$$(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^{n+1} = x^{n+1} + Ax^{n+2} + Bx^{n+3} + Cx^{n+4} + Dx^{n+5} + \text{etc.}$$

erit,

erit, quia haec expressio illi per $x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6$ multiplicatae est aequalis

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| $A' = A + 1$ | hinc | $B' = A' + B$ |
| $B' = B + A + 1$ | differentiis sumendis | $C' = B' + C$ |
| $C' = C + B + A + 1$ | | $D' = C' + D$ |
| $D' = D + C + B + A + 1$ | | $E' = D' + E$ |
| $E' = E + D + C + B + A + 1$ | | $F' = E' + F - 1$ |
| $F' = F + E + D + C + B + A$ | | $G' = F' + G - A$ |
| $G' = G + F + E + D + C + B$ | | etc. |

14. Quare si modo denotandi ante introducto vitamur, ex aequatione $G' = F' + G - A$ nascitur haec:

$$\binom{n+1}{n+8} = \binom{n+1}{n+7} + \binom{n}{n+7} - \binom{n+1}{n+1}$$

quae in genere ita representabitur:

$$\binom{n+1+\lambda}{n+1+\lambda} = \binom{n+1}{n+\lambda} + \binom{n}{n+\lambda} - \binom{n+1+\lambda-6}{n}$$

Quod si iam pro $n+\lambda$ scribatur N erit

$$\binom{n+1}{N+1} = \binom{n}{N} + \binom{n}{N} - \binom{n}{N-6}$$

vbi notandum est quantum fuerit $N-6 < n$ fore $\binom{n}{N-6} = 0$. Hinc simul patet omnes hos numeros fore integros, quod ex priori lege minus apparet.

Tabula

Tabula ostendens

quot modis quilibet numerus N per n tesseras cadere possit

| N | $n=1$ | $2n$ | $3n$ | $4n$ | $5n$ | $6n$ | $n=7$ | $n=8$ |
|----|-------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 5 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 0 |
| 9 | 0 | 4 | 25 | 56 | 70 | 56 | 28 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 27 | 80 | 126 | 126 | 84 | 36 |
| 11 | 0 | 2 | 27 | 104 | 205 | 252 | 210 | 120 |
| 12 | 0 | 1 | 25 | 125 | 305 | 456 | 462 | 330 |
| 13 | 0 | 0 | 21 | 140 | 420 | 756 | 917 | 792 |
| 14 | 0 | 0 | 15 | 146 | 540 | 1161 | 1667 | 1708 |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 140 | 651 | 1666 | 2807 | 3368 |
| 16 | 0 | 0 | 6 | 125 | 735 | 2247 | 4417 | 6147 |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 104 | 780 | 2856 | 6538 | 10480 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 80 | 780 | 3431 | 9142 | 16808 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 735 | 3906 | 12117 | 25488 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 651 | 4221 | 15267 | 36688 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 540 | 4332 | 18327 | 50288 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 420 | 4221 | 20993 | 65808 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 3906 | 22967 | 82384 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3431 | 24017 | 98813 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2856 | 24017 | 113688 |

Tom. XIV. Nou. Comm.

Z

N

| n | 1^n | 2^n | 3^n | 4^n | 5^n | 6^n | 7^n | 8^n |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2247 | 22967 | 125588 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1666 | 20993 | 133288 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1161 | 18327 | 135954 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 756 | 15267 | 133288 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456 | 12117 | 125588 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 9142 | 113688 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6538 | 98813 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4417 | 82384 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2807 | 65808 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1667 | 50288 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 917 | 36688 |

15. In his ergo feriendis etiam proprietates §. 12 inuenta locum habet; ita si fuerit $n = 6$ erit:

$$(N)^{(6)} = \frac{(N-1)(N-1)^{(6)} - (48-N)(N-6)^{(6)} + (43-N)(N-7)^{(6)}}{N-6}$$

vnde si exempli gratia $N = 25$ erit

$$(25)^{(6)} = \frac{24 \cdot (24)^{(6)} - 23 \cdot (19)^{(6)} + 18 \cdot (18)^{(6)}}{19}$$

at est $(24)^{(6)} = 3431$; $(19)^{(6)} = 3906$; $(18)^{(6)} = 3431$ ideoque

$$(25)^{(6)} = \frac{24 \cdot 3431 - 23 \cdot 3906 + 18 \cdot 3431}{19} = \frac{54264}{19} = 2856$$

vti tabula habet. Similiter si sit $N = 29$ erit

$$(29)^{(6)} = \frac{28 \cdot (28)^{(6)} - 19 \cdot (23)^{(6)} + 14 \cdot (22)^{(6)}}{23}$$

hinc

hinc ob $(28)^{(6)} = 1161$; $(23)^{(6)} = 3906$ et $(22)^{(6)} = 4221$ erit

$$(29)^{(6)} = \frac{32508 - 74214 + 59094}{23} = \frac{17388}{23} = 756$$

16. Verum evolutio formulae V (§. 7) alio modo institui potest, vt quilibet terminus absolute assignetur, neque ad hoc praecedentibus sit opus. Cum enim sit

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 = \frac{1-x^6}{1-x}$$

erit $V = \frac{x^n(1-x^6)^n}{(1-x)^n}$, atque evoluzione facta ob

$$(1-x^6)^n = 1 - n x^6 + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{12} - \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{18} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} x^{24} - \text{etc.}$$

$$\frac{x^n}{(1-x)^n} = x^n + \frac{n}{1} x^{n+1} + \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} x^{n+2} + \frac{n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{n+3} + \dots + \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} x^{n+4} + \dots$$

vnde colligitur fore:

| | |
|---|--|
| $(n)^{(n)} = 1$ | $(n+6)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+5)}{1 \cdot \dots \cdot 6} = \frac{n}{1}$ |
| $(n+1)^{(n)} = \frac{n}{1}$ | $(n+7)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+6)}{1 \cdot \dots \cdot 7} = \frac{n \cdot 6}{1 \cdot 7}$ |
| $(n+2)^{(n)} = \frac{n \cdot (n+1)}{1 \cdot 2}$ | $(n+8)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+7)}{1 \cdot \dots \cdot 8} = \frac{n \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 8}$ |
| $(n+3)^{(n)} = \frac{n \cdot (n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$ | $(n+9)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+8)}{1 \cdot \dots \cdot 9} = \frac{n \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 9}$ |
| $(n+4)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+3)}{1 \cdot \dots \cdot 4}$ | $(n+10)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+9)}{1 \cdot \dots \cdot 10} = \frac{n \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 10}$ |
| $(n+5)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+4)}{1 \cdot \dots \cdot 5}$ | $(n+11)^{(n)} = \frac{n \cdot \dots \cdot (n+10)}{1 \cdot \dots \cdot 11} = \frac{n \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 11}$ |

Z 2

(n+12)

$$(n+12)^{(n)} = \frac{n \cdot n \cdot \dots \cdot (n+11)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 11} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot 1$$

$$(n+13)^{(n)} = \frac{n \cdot n \cdot \dots \cdot (n+12)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 12} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot 1$$

etc.

vnde in genere concluditur :

$$(n+\lambda)^{(n)} = \frac{n \cdot n \cdot \dots \cdot (n+\lambda-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (\lambda-1)} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{n \cdot n \cdot \dots \cdot (n+\lambda-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (\lambda-2)} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{n \cdot n \cdot \dots \cdot (n+\lambda-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (\lambda-3)} + \dots$$

17. Hinc solutio ad tesserar quoque alio facierum numero praeditas accommodari potest. Sit enim *m* numerus facierum in singulis tesseris, quae notatae sunt numeris 1, 2, 3... *m* talium autem tesserarum numerus sit = *n*, quibus proiectis quaeritur, quot modis datus numerus *N* cadere possit. Seu quod eodem redit, quaeritur quot modis numerus *N* in *n* partes resolui possit, quae singulae in hoc ordine numerorum 1, 2... *m* sint contentae; vbi quidem notandum est non solum diuersas partitiones, sed etiam diuersos ordines eorundem partium numerari, vti in tesseris fieri solet, vbi exempli gratia iactus 3, 4 et 4, 3 pro duobus diuersis casibus habentur.

18. Quodsi ergo haec scriptio $(N)^{(n)}$ denotet casuum numerum, quibus numerus *N* proiciendis *n* tesseris, quarum singulae habeant *m* facies numeris 1, 2, 3... *m* notatas, produci possit; primo notandum

tantum est fore $(n)^{(n)} = 1$, et si $N < n$ esse $(N)^{(n)} = 0$. Deinde si $N = mn$ est quoque $(mn)^{(n)} = 1$, et si $N > mn$ erit $(N)^{(n)} = 0$. Denique siue sit $N = n + \lambda$ siue $N = mn - \lambda$, numerus casuum est idem seu $(n + \lambda)^{(n)} = (mn - \lambda)^{(n)}$. Postrema autem formula praebet :

$$(n+\lambda)^{(n)} = \frac{n \cdot n \cdot \dots \cdot (n+\lambda-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (\lambda-1)} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{n \cdot n \cdot \dots \cdot (n+\lambda-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (\lambda-2)} + \dots$$

19. Facillime autem hi numeri cum ex praecedentibus tum ex casibus, vbi tesserarum numerus est vitate minor, determinabuntur. Erit enim generaliter, si singularum tesserarum numerus facierum fuerit = *m*, eaeque numeris 1, 2, 3... *m* sint insignitae :

$$(N+1)^{(n+1)} = (N)^{(n+1)} + (N)^{(n)} - (N-m)^{(n)}$$

seu $(N+1)^{(n)} = (N)^{(n)} + (N)^{(n-1)} - (N-m)^{(n-1)}$. Hinc si pro $N+1$ scribatur $n+\lambda$ habebitur $(n+\lambda)^{(n)} = (n+\lambda-1)^{(n)} + (n+\lambda-1)^{(n-1)} - (n+\lambda-m-1)^{(n-1)}$. Denique pro eodem tesserarum numero *n* isti numeri ita a praecedentibus pendunt, vt sit $\lambda(n+\lambda)^{(n)} = (n+\lambda-1)(n+\lambda-1)^{(n)} - (mn+m-\lambda)(n+\lambda-m)^{(n)} + (mn-n+m+1-\lambda)(n+\lambda-m-1)^{(n)}$

Ceterum notum est summam omnium horum numerorum esse = m^n .

20. Simili modo haec quaestio resolui potest, si non omnes tesserarum pari hedrarum numero fuerint

demonstrandum est functionem S omnes potestates ipsius x complecti. Nam P aequatur seriei $1+x+x^2+\dots+x^{16}+\dots$ etc. et Q praeterea eas continet potestates ipsius x , quarum exponentes sunt aggregata duorum quadratorum, in qua ergo serie multae adhuc potestates desunt. In R autem insuper eae potestates, quarum exponentes sunt aggregata ternorum quadratorum, adierunt; atque in S quoque eae; quarum exponentes sunt summae quaternorum ita ut in S omnes numeri in exponentibus occurrere debeant.

27. Ex hoc principio deserviri potest, quot solutiones problemata, quae ab arithmeticis ad regulam Virginiam referri solent, admittat. Huiusmodi problemata haec redeunt, ut inveniri debeant numeri p, q, r, s, t etc. ita ut his duabus conditionibus satisfiat:

$$ap + bq + cr + ds \text{ etc.} = n \text{ et}$$

$$ap + b^2q + \gamma r + \delta s \text{ etc.} = v$$

et iam quaestio est, quot solutiones in numeris integris positiviis locum sint habiturae: vbi quidem tenendum est numeros a, b, c, d etc. n et $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, etc. v esse integros, quia nisi tales essent, facile eo reducerentur. Statim quidem apparet, si duo tantum numeri inveniendi p et q proponantur, plus una solutione non dari, quae adeo, nisi pro p et q numeri integri positivi prodeant, pro nulla haberi solet.

28. Iam ad numerum omnium solutionum quouis casu deservendum, ne inductioni seu tentationi quicquam tribuatur, consideretur haec expressio

$$\frac{1}{(1-x^2y^2)(1-x^4y^4)(1-x^6y^6)(1-x^8y^8) \text{ etc.}}$$

eaque evoluetur; unde prodibit huiusmodi series

$$1 + Ax^2y^2 + Bx^4y^4 + Cx^6y^6 \text{ etc.}$$

in qua si occurrat terminus Nr^2y^r , coëfficiens N numerum solutionum, indicabit: ac si eueniat, ut hic terminus non occurrat, id indicio erit nullam dari solutionem. Totum ergo negotium in hoc versatur, ut coëfficiens huius termini x^ny^n inuestigetur.