



1862

De criteriis aequationis $fxx + gyy = hz^2$, utrum ea resolutionem admittat nec ne?

Leonhard Euler

Follow this and additional works at: <https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works>

 Part of the [Mathematics Commons](#)

Record Created:

2018-09-25

Recommended Citation

Euler, Leonhard, "De criteriis aequationis $fxx + gyy = hz^2$, utrum ea resolutionem admittat nec ne?" (1862). *Euler Archive - All Works*. 556.

<https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/556>

Multiplicetur per $d\Phi \sin. \Phi^{-1n} \cos. \Phi$ et integratur, erit

$$f/d \sin. \Phi^{-2n} \sin. 2n\Phi = \frac{1}{(1-n)} \sin. \Phi^{-2n+1} + \frac{2n(1-n)(1+2n)}{(1-n)} \sin. \Phi^{-2n-1} + \dots$$

Statuantur pariter, integratione absoluta, $\sin. \Phi = \frac{1}{2}$, seu $\Phi = 30^\circ$, ac probabit series $Q = 2^{1-2n} \int d\Phi \sin. \Phi^{-2n} \sin. 2n\Phi$. Quocirca seriei propositae summa ita exprimitur, ut sit

$$s = 2^{1-2n} \int d\Phi \sin. \Phi^{-2n-1} \cos. (\Phi - 2n\Phi) + 2^{1-2n} \int d\Phi \sin. \Phi^{-2n} \sin. 2n\Phi + 2^{1-2n} \int d\Phi \cos. (\Phi - 2n\Phi) \sin. \Phi^{-2n-1} + 4 \int d\Phi \sin. 2n\Phi (2 \sin. \Phi)^{-2n}.$$

et quia haec summa iam altunde est cognita, habebitur

Corollarium I.

§. 58. Si ponatur $2n = \frac{1+\lambda}{2}$, erit $1 - 2n = \frac{1-\lambda}{2}$, qua positione nostra aequatio fit concinnior, eritque

$$\frac{\pi}{\sin. \frac{1-\lambda}{2}} = 4 \int d\Phi \cos. \frac{1+\lambda}{2} \Phi + 4 \int d\Phi \sin. \frac{1-\lambda}{2} \Phi = \frac{\pi \sqrt{2}}{(2 \sin. \Phi)^{\frac{1+\lambda}{2}}} + \frac{\pi \sqrt{2}}{(2 \sin. \Phi)^{\frac{1-\lambda}{2}}} = \frac{\pi \sqrt{2}}{\cos. \frac{\lambda}{2}} - \frac{\pi \sqrt{2}}{\sin. \frac{\lambda}{2}}$$

posito post integrationem $\Phi = 3e^\circ$.

Corollarium 2.

§. 59. Simili modo sumto λ negative, erit

$$\frac{\pi}{\sin. \frac{1+\lambda}{2}} = 4 \int d\Phi \cos. \frac{1-\lambda}{2} \Phi + 4 \int d\Phi \sin. \frac{1+\lambda}{2} \Phi = \frac{\pi \sqrt{2}}{(2 \sin. \Phi)^{\frac{1-\lambda}{2}}} + \frac{\pi \sqrt{2}}{(2 \sin. \Phi)^{\frac{1+\lambda}{2}}} = \frac{\pi \sqrt{2}}{\cos. \frac{\lambda}{2}} + \frac{\pi \sqrt{2}}{\sin. \frac{\lambda}{2}}$$

vbi quidem notasse iunabit, omnibus casibus, quos enucleare licet, eandem harum formularum integralium valorem actu reperiri, quem hic exhibuimus.

DE

DE

CRITERIIS AEGVATIONIS

$$fxx + eyy = bz^2$$

VTRVM EA RESOLVTIONEM ADMITTAT

NEC NE?

§. I.

Notum est huiusmodi aequationem, pro varia relatione, quae inter numeros f, g et b intercedit, modo esse possibilem modo impossibilem, siquidem pro x, y et z numeros rationales accipi oportet, atque adeo integros, quia fracti facillime ad integros reuocarentur. Ita notum est hanc aequationem: $xx + yy = az^2$ esse possibilem; hanc vero: $xx + yy = 3zz$ impossibilem. Quando autem inter f, g et b maiores tenent valores, iudicium, vtrum aequatio sit possibilis nec ne, difficulter instituitur; in maximis vero numeris vix suscipiendum videtur. Hic igitur constitui in certa criteria inquirere, ex quibus iudicare liceat, vtrum haec aequatio sit possibilis nec ne, quantumuis magni fuerint numeri f, g et b .

§. 2. Ante omnia autem sequentia notasse iunabit:

1°. Numeros f, g et b non solum integros affirmo, sed etiam non-quadratos, neque etiam per quadratum diuisibiles;

DE

bles; si enim numerus f haberet factorem quadratum, is in quadrato $x x$ involui posset, quod etiam de reliquis tendendum.

II°. Præterea hos numeros æque negativos ac positivos assumere licet; et quia æquatio ita semper disponi potest, ut membra $f x x$ et $b z z$ obtineant valores positivos, solum membrum $g y y$ relinquatur, quod vel positivum vel negativum esse poterit.

III°. Numeros f et g tanquam primos inter se spectamus: si enim haberent communem divisorem d ; vel numerus b eundem habere deberet, quo casu ille per divisionem tolleretur; vel quantitas z per d esset divisibilis. Vnde si loco z scribamus $d v$, nostra æquatio ad hanc formam reduceretur: $f x x - g y y = d b v v$, ita ut nunc f et g futuri sint primi inter se.

IV°. Denique notandi sunt casus maxime obuii, quibus æquatio nostra sit possibilis. Primo scilicet hoc evenit si fuerit vel $b = f$, vel $b = g$; illo enim casu foret $y = 0$ et $z = x$, hoc vero $x = 0$ et $z = y$. Tum vero etiam casus factis obuius erit, si fuerit $b = f + g$, quia ei satisficeret, sumendo $z = x = y$. Minus obuii autem erunt casus, quibus $b = f a a + g b b$; foret enim tum $x = a$, $y = b$ et $z = 1$.

§. 3. Primam autem inuestigabo, datis numeris f et g , cuiusmodi numeri pro b locum habere queant, ut æquatio fiat possibilis. Quare quum hic b ut numerum incognitum spectemus, æquationem nostram hac forma referamus: $f x x + g y y = b z z$, ut iam idoneos valores pro

discuram, is de reliquis

ac positivos disponi potest, solum vel

specia-

per diuis-

hanc for-

quibus æ-

erit vel

casus factis sumendo

quibus

numeris f et g , cuiusmodi numeri pro b locum habere queant, ut æquatio fiat possibilis. Quare quum hic b ut numerum incognitum spectemus, æquationem nostram hac forma referamus: $f x x + g y y = b z z$, ut iam idoneos valores pro

pro littera s inuestigari oporteat, quibus æquatio fiat possibilis, et quidem omnes qui hoc præstent, quem in finem sequentia Theoremata adiungo.

Theorema I.

Si casu $s = b$ possibilis fuerit æquatio $f x x + g y y = b z z$, ita ut litteræ x, y, z iam sint cognitæ, si vero insuper habeatur hæc æquatio: $p p + f g . q q = k r r$, tum nostra æquatio quoque erit possibilis casu $s = b k$.

Demonstratio.

Multiplicentur enim hæc due æquationes in se, et prodibit hæc noua æquatio:

$$b k r r z z = (f x x + g y y) (p p + f g q q)$$

$$= f (p x + g q y)^2 + g (p y + f q x)^2.$$

Quare si statuamus

$$r z = Z, p x + g q y = X \text{ et } p y + f q x = Y,$$

nasctur hæc æquatio propostæ omnino similis:

$$f X^2 + g Y^2 = b k Z^2.$$

Corollarium I.

§. 4. Quodsi ergo litteræ p et q ita assumere liceant, ut k obtineat factorem b , scilicet $k = b l$, tum ob $s = b b l$ nonus valor idoneus erit $s = l$, quoniam quædratum $b b$ omittere licet.

Corollarium 2.

§. 5. Quemadmodum igitur ex illo valore idoneo $s = b$ eruitur est alius $s = b k$, siue $s = l$, ita ex hoc

Corollarium 3.

§. 11. Quando autem hi noui valores per quada, vii praeceptimus, deprimuntur, continuo hielem casus cogniti reuerent. Quum enim sit $b''' = b' b''$, forma $b' b'' b'''$ reducitur ad b'' , haec vero: $b' b'' b'''$ ad b' , et $b' b'' b'''$ ad b , ita vt reuera vnus tantum casus nouus hoc modo reperiat.

Theorema III.

Si aequationi nostrae $f x x + g y y = s z z$ satisfiat casus $s = b$, tum quoque omnes isti valores satisfacient:

$s = 4 f g + b$; $s = 9 f g + b$; $s = 12 f g + b$; $s = 16 f g + b$; etc.
 quin etiam, si b fuerit numerus satis magnus, isti:
 $s = b - 4 f g$; $s = b - 8 f g$; $s = b - 12 f g$;
 et in genere $s = b \pm 4 n f g$, dummodo hi numeri fuerint primi.

§. 12. Huius elegantissimi Theorematis demonstratio adhuc desideratur, postquam a pruribus iam dudum frustrata est inuestigata; cuius rei difficultas manifeste in hoc est: quod omnes hi numeri tum demum quaevis satisfaciant, quando sunt numeri primi. Quando enim sunt compositi euenire potest, vt non satisfaciant; etiam non semper a seopo aberrant. Quum autem hic tantum valeant numeri primi, probe notandum est, numeros negativos, qui ex formula $s = b - 4 f g$ resultare possunt, non pro primis esse habendos. Quocirca plurimum is praestitisse erit cen-

fendus, inuenire

finitum rum pr numero

fit. possi forma: etiam e meri su

Ios aut quadrati stratum, stium a bit sur compo mum p meron mlae f

§ satisfieri dabit fo Buleri: Q

fendus, cui successerit demonstrationem huius Theorematis inuenire.

Corollarium 1.

§. 13. Quum hoc modo saltem ascendendo in infinitum progredi liceat, etiam multitudine valorum idoneorum pro s eo vsque augeri poterit, quo vsque Tabula numerorum primorum fuerit constructa.

Corollarium 2.

§. 14. Ita quum haec aequatio: $x x + y y = z z$, sit possibilis vbi est $f = 1$, $g = 1$ et $s = b = 1$, haec forma: $4 n + 1$, quatenus scilicet praebet numeros primos, etiam totidem valores idoneos pro s suppetitabit, qui numeri sunt

1, 5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61, 73, 89, 97, etc.

Ios autem numeros omnes ipsos aequari summae duorum quadratorum, iam dudum rigorosissime a me est demonstratum, vnde eo minus de demonstratione reliquorum casuum desperare fas est. His igitur omnibus casibus licet bit sumere $s = 1$. Interim tamen hinc etiam numeros compositos pro s inuenire licet, dum per Theorema primum producta ex binis vel pluribus horum ipsorum numerorum etiam pro s valebunt, quoniam binae illae formulae $f x x + g y y$ et $p p + f g q q$ hoc casu congruant.

Corollarium 3.

§. 15. Quia aequationi $2 x x + 3 y y = s z z$, satisfieri potest casu $s = 341$, alios casus idem praestantes dabit formula $341 + 24 n$, quocies scilicet prodierint numeri

er qua n casus forma 1 b, et nouus
 s satis- es satis- + b; etc.
 sit. possi forma: etiam e meri su fuerint
 instratio vltra est est sua: sfaciant, ompositi mper a t nume qui ex primis erit cen- fen-

§ satisfieri dabit fo Buleri: Q

meri primi. Hinc ergo descendendo oriuntur sequentes valores:

341, 317, 293, 269, 197, 173, 149, 101, 53, 29, 5.

Hi autem omnes numeri ipsi iam in forma $1. x \cdot x + 3 y y$ continentur, ita ut possit esse $x = 1$.

Scholion.

§. 16. Hoc Theoremate, quod demonstratum est, premissis, pro quouis casu numerorum f et g omnes plane valores idonei litterae s facile inveniri poterunt. Ad hoc autem ostendendum, duos casus separatim tractari oportet: priorem, quo $f = 1$, atque idcirco primi termini primi Theorematis inter se continentur; alterum vero, quo f non est unitas. Unde primo aequationem $x \cdot x + 3 y y = s \cdot s$ conollemus.

Problema 1.

Proposita aequatione $x \cdot x + 3 y y = s \cdot s$, invenire omnes valores idoneos pro s , quibus haec aequatio evadit possibilis.

Solutio.

§. 17. Hic statim evidens est valorem idoneum fore $s = g$; tum enim fit $x = 0$ et $y = g$. Est enim $4 g^2 + 9 g^2 = 16 g^2$ etc. aequae satisfaciunt, tamen omnes per quadratum depreffi redeunt ad g . Verum sumto $y = 0$, omnes numeri quadrati pro s prodeunt, quos igitur omnes ad unitatem reducere liceret. Sed quia praeter hos ipsos numeros etiam idem, numeris $4 n g$ sine auxilio sine unitatis satisfaciunt, quatenus scilicet prodeunt numeri primi, haec

haec sequentes
quoniam
quia
rem
tant
mer
tum
etiam
haec
hanc
ergo
4 n
vbi
4 g
obtin
tem
tur
ma
etiam
1 +

3, 5.
+ 3 y y
im esse,
es plane
Ad hoc
oportet:
si Theo-
est uni-
z conol-

quos idoneam
per qua-
y = 0,
r omnes
tos ipsos
sue nai-
i primi,
haec

haec quadrata hic negligere non licet. His autem tantum quadratis indigemus, quae ad numerum $4 g$ fuerint primi, quia aliter nulli numeri primi inde emergent; quamobrem statim omnia quadrata paria hinc excluduntur, et his tantum imparibus locus conceditur, quorum radices ad numerum g fuerint primi. Semper ergo hic occurrit unitas, tum vero etiam novem, nisi g sit per 3 divisibilis, porro etiam 25, nisi g divisorem habeat 5, etc. Quando autem haec quadrata excedunt numerum $4 g$, eorum loco scribantur residua ex divisione per $4 g$ remanentia. Ponamus ergo hinc prodire formulas:

$$4ng + 1; 4ng + a; 4ng + b; 4ng + c; 4ng + d; \text{etc.}$$

$$vbi scilicet a, b, c, d, \text{ ea residua, quae ex quadratis per } 4g \text{ divisibilia restant, Verum praeter hos casus alius est obitus } s = 1 + g, \text{ siquidem } g \text{ fuerit numerus par; sin autem fuerit impar, sumatur } s = 4 + g, \text{ ut scilicet habeatur numerus ad } 4g \text{ primus. Tum vero quia per Theorema primum producta ex his numeris satisfaciuntur etiam satisfaciunt, habebimus insuper istas formulas, loco } 1 + g \text{ vel } 4 + g \text{ scribendo } b:$$

$$s = 4ng + b; 4ng + a + b; 4ng + b + b;$$

$$4ng + c + b; 4ng + d + b; \text{etc.}$$

quos omnes valores coniunctim ita ob oculos conficiamus:

$$s = 4ng + (1, a, b, c, d, \text{ etc.})$$

$$b, a + b, b + b, c + b, d + b, \text{ etc.}$$

Quae omnes formulae eateus valent, quatenus numeros primos producant, hocque modo omnes plane numeri primi idonei reperientur; compositi autem nulla plane laborant difficultate, quum nascantur ex duobus pluribusque

numeris primis idoneis. Quin etiam ipsum numerum g , eiusque producta per numeros iam inuenos, annumerari oportet.

Corollarium 1.

§. 18. Quia veritas huius solutionis nondum plane est evicta, casus aliquos obuios consideremus, quos semper in aliqua superiorum formularum contineri deprehendemus. Ita casus $s = 1 + 4g$ continetur in formula $4ng + 1$, et $s = 1 + 9g$ continetur in formula $4ng + b$, si fuerit $b = 1 + 9g$; ac si $b = 4 + 9g$, in ea continbitur $s = 4 + 9g$. Similique modo res se habet in formulis $x + 16g$; $x + 25g$; $x + 36g$; vel $4 + 9g$; $4 + 25g$; etc. Vbi eos casus, qui numeros primos producere nequeunt, excludimus.

Corollarium 2.

§. 19. Haec solutio aequae locum habet, siue g sit numerus positius, siue negatiuus. At quia hoc posteriori casu, in formulis inuentis littera b obtinet valorem negatiuum, loco terminorum b , a, b , b, c etc. eorum complementa ad numerum $4g$ scribantur.

Corollarium 3.

§. 20. Casu quo g est numerus negatiuus, si iam fuerint inuenitae formulae superiores, quae valent pro formulis $x x - g y y$, si ibi signa mutantur, siue loco numerorum x, a, b, c, d , etc. scribantur eorum complementa ad $4g$, tum illae inferuntur huic aequationi:

$g y y - x x = s z z$

Scho-

Scholion.

§. 21. Haec autem maxime illustrabuntur et facillius in usum vocari poterunt, si plura exempla adiungamus, quibus etiam natura numerorum aliaque abstrusae proprietates clarius perspicentur.

Exemplum 1.

Sit $g = 1$ et aequatio proposita $x x + y y = s z z$, atque hic pro valoribus ipsius s vnica habetur formula $4n + 1$. Casus autem $1 + 9g = 2$, quia ad $4g$ non est primus, generali formulae inuecti nequit; interim tamen formam praebet numerum idoneum $= 2$. Pro numeris igitur primis satisfaciendis praeter 2 habemus superiorem seriem:

- 1, 5, 13, 17, 29, 37, 41, etc.

et producta ex quocunque horum praebebunt omnes numeros compositos satisfaciendes. At pro casu $g = -1$, seu aequatione $x x - y y = s z z$, praeter formam $4n + 1$, ex quadratis ortam, formula $4 + 9g = 3$ dabit insuper hanc: $4n + 3$. Sicque omnes numeri primi in alterutra harum duarum formularum: $4n + 1$ et $4n + 3$ erunt contenti, ideoque omnes plane numeri primi hoc casu sunt idonei, quippe quos omnes in differentiam duorum quadratorum resolvere licet. Hinc quidem 2 excluditur, quoniam differentia duorum quadratorum esse nequit, atamen valorem pro s dari potest, siquidem pro z sumatur numerus par. Nam 2.4 vtiqve est $9 - 1$.

Exemplum 2

§. 22. Sit nunc $g = 2$ et proposita haec forma: $x x + 2 y y = s z z$, vbi quam sit $4g = 8$, quadrata imparia

Ec 3

Scho-

terum g , eiusque oportet. nondum plane, quos semper in deprehendi in formula $4ng + b$, ea continbitur et in formulis $4 + 9g$; $4 + 25g$; etc. Vbi eos casus, qui numeros primos producere nequeunt, excludimus.

x

$xx+7yy=szx$	$s=28n+(1,11,23,9,25,15)$ cum numero 7
Num. primi	7; 1, 11, 23, 29, 37, 43, 53, 67, 71, 79,
$xx-7yy=szx$	$s=28n+(1,9,25)$ cum - 7
Num. primi	-7; 1, 29, 37, 43, 83, etc.
$xx+10yy=szx$	$s=40n+(1,9,11,19)$ cum 10
Num. primi	10; 1, 11, 19, 41, 59, 89, etc.
$xx-10yy=szx$	$s=40n+(7,9,31,39)$ cum - 10
Num. primi	-10; 1, 31, 41, 71, 79, 89, etc.
$xx+11yy=szx$	$s=44n+(1,9,25,51,37)$ cum 11
	$(15,3,23,31,27)$
Num. primi	+11; 1, 3, 5, 23, 31, 37, 47, 53, 59, 67, 71, 89, 97
$xx-11yy=szx$	$s=44n+(1,9,25,53,37)$ cum - 11
Num. primi	-11; 1, 5, 37, 53, 89, 97, etc.

Problema 2.

Propofita aequatione $fx+gy=sxz$, inuenire omnes numeros primos, qui pro s valores idoneos praebent, quibus haec aequatio euadit possibilis.

Solutio.

§. 25. Sit b valor quicunque idoneus pro z , et per Theorema nondum demonstratum patet, omnes numeros primos in hac formula contentos: $4nf+g+b$, pariter pro s valere; ex quo manifestum est, ipsum valorem b ad $4fg$ primum esse debere. Talis autem valor facile inuenitur. Si enim ambo numeri f et g fuerint impares, capietur $b=4f+g$, siue $b=f+4g$; sin autem numerorum f et g alter fuerit par, alter impar, valor idoneus habetur $b=f+g$. Quo autem alii insuper numeri primi, atque adeo omnes, pro s obtineantur, consideretur formu-

ti
r
b
nk
pi
di
E

in numero 7	79,
in 11	67, 71, 89, 97
in 11	- 11

$y=sxz$, inuenire valores idoneos possibilis.

idoneus pro z , et ceteri, omnes numeri $4nf+g+b$, pariter in valorem b ad $4fg$ facile inueniuntur impares, capietur autem numerus $b=f+g$, valor idoneus pro numeri primi, consideretur formu-

ti
r
b
nk
pi
di
E

la $pp+feqq=kr^2$, atque in problemate praecedente iam assignauimus omnes primos pro k valentes, qui sunt $4nfg+(1, a, b, c, d, \text{etc.})$; nunc hae duae aequationes ducantur in se et iam offendimus prodire huiusmodi formam: bkr^2z , siue $bZ^2=fX^2+gY^2$, quocirca productum bZ^2 etiam dabit valorem idoneum pro s ; unde perspicuum est, omnes numeros primos pro s idoneos contineri debere in hac forma generali:

$$s=4nfg+(b, ab, b^2, cb, d^2, \text{etc.}).$$

Cognitis autem numeris primis pro s valentibus, qui notaee aequationi $fx+gy=sxz$ satisfaciunt, si insuper omnes numeri primi pro k adhibendi innotescant, qui sunt A, B, C, D, etc., tum producta priorum pro s inuentorum in singulos, vel binos, vel ternos etc. horum posteriorum praebunt etiam valores idoneos pro s , haeque adeo modo facile erit infinitos valores litterae x exhibere.

Corollarium I.

§. 26. Si eueniat ut primus valor pro b inuentus sit quadratus, tum, quia is iam in ordine numerorum $1, a, b, c, d, \text{etc.}$ consistat, iidem valores pro s locum habebunt, qui pro k sunt assignati.

Corollarium 2.

§. 27. Sin autem numerus b in ordine $1, a, b, c, d$ non contineatur, tum nullo modo fieri poterit, ut valores pro s et k inter se conueniant, sed omnes a se iunctim discrepabunt.

Euleri Opus. Anal. Tom. I.

F f

Exem-

Exemplum 1.

§. 28. Propofita fit aequatio $2xx + 3yy = sz$, ubi $f = 2$ et $g = 3$ primus autem valor $b = 5$. Tum ergo confideretur aequatio $p^2 + 6qq = krr$, et vidimus valores primos pro k contineri in hac formula: $24n + (1, 7)$. His igitur numeris 1, 7 in $b = 5$ dectis, omnes numeri primi pro s in hac formula continentur: $24n + (5, 11)$, qui funt: 5, 11, 29, 53, 59, 83, etc.

Pro aequatione $2xx - 3yy = sz$, ubi $f = 2$ et $g = -3$, valor cognitus habetur $b = -1$, siue $b = 23$; at aequationi $p^2 - 6qq = krr$, pro k inventa est formula $24n + (1, 19)$, vnde omnes numeri primi pro s funt: $24n + (5, 23)$, quae formula praebet hos numeros primos: 5, 23, 29, 47, 53, 71, etc.

Verum pro hac aequatione $3xx - 2yy = sz$, ubi $f = 3$ et $g = -2$, valor b fit $= 1$; et quia formula $p^2 - 6qq = krr$ eadem est quae ante, iidem etiam numeri primi pro s in formula: $24n + (1, 19)$ continentur; hincque ipsi numeri primi: $24n + (5, 23)$, qui igitur fiunt: 5, 23, 29, 47, 53, 71, etc.

Exemplum 2.

§. 29. Propofita aequatione $2xx + 5yy = sz$, ubi $f = 2$ et $g = 5$, primus valor b fit $= 7$, et quia aequationi $p^2 + 10qq = krr$, conuenit formula $40n + (1, 9, 11, 19)$, pro valoribus primis ipsius s habebimus $f = 40n + (7, 23, 37, 13)^2$, ergo ipsi numeri primi erunt 7, 13, 23, 37, 47, 53, etc.

At

At propofita aequatione $2xx - 5yy = sz$, fit statim $b = -3$; et quia pro aequatione $p^2 - 10qq = krr$ inuenimus formulam $40n + (1, 9, 31, 39)$, numeri primi quaefti continebuntur in hac formula:

$40n + (37, 13, 27, 3)$
ergo ipsi numeri primi erunt:

3, 13, 37, 43, 53, 67, 83, etc.

Denique pro formula $5xx - 2yy = sz$, ob $b = 3$, ex iisdem numeris k numeri quaefti pro s funt: $40n + (37, 13, 27, 3)$.

Scholion 1.

§. 30. Quae haecenus iam tradita hisque exemplis illustrata funt, omnes numeros primos pro s satisfaciētes fuppediant, qui in se iunctim multiplicati, vt praecipimus, dant numeros compofitos aequae satisfaciētes. Neque vero hinc femper omnes plane numeri compofiti pro s idonei obtinentur; fed dantur cafus, quibus praeterea alii numeri primi in valores compofitos ipsius s ingrediuntur. Causa huius rei in eo confiftit, quod in inueftigatione fuperiori numeris pares statim excluſimus, qui tamen, cum aliis numeris primis iuncti, quaeftio satisfaciēre poſſunt. Ad hos ergo eruendos ponamus statim $f = 2b$, vt fit $f = 2x + 2xy = b^2z$.

Quod si iam haec formula $f = 2x + 2xy$ praebet numerum imparē, siue productum ex impari in quadratum par, ex eo statim infinitos alios valores pro b clicere licet. Sic enim a eiusmodi numeris impar, et quum pro forma x^2

F f 2

At

statim inueni mi q

$b = 3$,

$3yy = sz$,
Tum ergo vidimus valores $24n + (1, 7)$, omnes numeri $n + (5, 11)$

ubi $f = 2$ et $g = 23$; 1 est formula pro s funt: us primos:

Illustra: sz , ubi quia formula in etiam numeris, dant numeros compofitos, qui igitur idonei numeri Causa periori aliis in hos erit

$5yy = sz$, et quia aequatione

Quod impari ex eo enim a

At

$xx + fgyy = sxx$ omnes valores primi ipsius s in hac forma continentur: $4fg + (x, a, b, c, d, \text{etc.})$, omnes numeri primi idonei pro nostra littera b in hac forma continentur:

$4fg + (a, aa, ab, ac, ad \text{ etc.})$

qui si fuerint diversi ab his, quos ante sumus affecti, etiam ipsanti alii habebuntur numeri primi, qui in compositionem numeri s ingredi possunt. Singuli enim isti numeri, quos litteris A, B, C, D, designemus, per 2 multiplicandi, idoneos praebent valores pro s , qui ergo erunt: $2a, 2b, 2c, 2d, \text{etc.}$ Et quia producta ex binis eorum etiam satisfaciunt, hinc nascuntur numeri impares, $a, b, a^2, ad, bc, bd, cd, \text{etc.}$ Ita in exemplo $xx + 3yy = sxx$, formula $\frac{xx + 3yy}{2}$ statim dat -1 . Quum ergo pro hoc casu inuenta sit formula $s = 12n + 1$, pro valoribus ipsius b habebimus formulam $12n - 1$, siue $12n + 11$, quae praebet hos numeros primos:

11, 23, 47, 59, 71, 83.

qui duplicati omnes etiam satisfaciunt, atque etiam producta ex eorum binis, tum vero etiam producta ex his in singulis eorum, quos ante iam assignauimus; hocque pacto multiplicando valorum compositionum vehementer augetur. Hoc praecipue his casibus visu venit, ubi formulae supra inuenta ex paucioribus membris constabant. Pro formula autem $xx + 7yy = sxx$, eius dimidium $\frac{xx + 7yy}{2}$ praebet 4, siue $x = a$, qui valor quum iam in formula supra data continetur, hinc noni valores non oriuntur. At vero formula $\frac{xx + 7yy}{2}$ praebet $a = -3$, ideoque valores pro b erunt $28n + (25, 1, 9)$, qui numeri iam antea occurrunt. Hoc ergo probe obseruare oportet eam, qui etiam omnes

numeros in hac forma

tur in compositionem numeri primi ipsius s in hac forma continentur, quos ante sumus affecti, etiam ipsanti alii habebuntur numeri primi, qui in compositionem numeri s ingredi possunt. Singuli enim isti numeri, quos litteris A, B, C, D, designemus, per 2 multiplicandi, idoneos praebent valores pro s , qui ergo erunt: $2a, 2b, 2c, 2d, \text{etc.}$ Et quia producta ex binis eorum etiam satisfaciunt, hinc nascuntur numeri impares, $a, b, a^2, ad, bc, bd, cd, \text{etc.}$ Ita in exemplo $xx + 3yy = sxx$, formula $\frac{xx + 3yy}{2}$ statim dat -1 . Quum ergo pro hoc casu inuenta sit formula $s = 12n + 1$, pro valoribus ipsius b habebimus formulam $12n - 1$, siue $12n + 11$, quae praebet hos numeros primos:

$c, d,$
tum
 $fa +$
erique

s in hac forma

affecti, in compositionem numeri primi ipsius s in hac forma continentur, quos ante sumus affecti, etiam ipsanti alii habebuntur numeri primi, qui in compositionem numeri s ingredi possunt. Singuli enim isti numeri, quos litteris A, B, C, D, designemus, per 2 multiplicandi, idoneos praebent valores pro s , qui ergo erunt: $2a, 2b, 2c, 2d, \text{etc.}$ Et quia producta ex binis eorum etiam satisfaciunt, hinc nascuntur numeri impares, $a, b, a^2, ad, bc, bd, cd, \text{etc.}$ Ita in exemplo $xx + 3yy = sxx$, formula $\frac{xx + 3yy}{2}$ statim dat -1 . Quum ergo pro hoc casu inuenta sit formula $s = 12n + 1$, pro valoribus ipsius b habebimus formulam $12n - 1$, siue $12n + 11$, quae praebet hos numeros primos:

nam supra
Ar vero b
res pro b
occurrunt.
im omnes
nu-

numeros compositos pro s satisfaciunt investigare voluerit, vnde huic negotio immorari superfluum foret.

Scholion 2.

§. 31. Quantumvis autem haec egregia videantur, vitique hic erit dolendum, quod nondum firmis demonstrationibus sunt munita, cuius rei ratio potissimum in eo sita videtur, quod formulae pro s inuenta eaeus tantum valent, quatenus numeros primos suppediant. Quamquam autem omnes labores a me suscepti spem meam fecerunt, tamen spero, conatus meos his, qui huiusmodi speculationibus delectantur, non fore ingratos, praecipue quia iam memoratam illam difficultatem circa numeros primos de medio sustuli, ita ut nunc sine dubio aditus ad ista numerorum mysteria non mediocriter facilius reddi videatur.

Propositio 1.

§. 32. Si fuerit $fx + gyy = sxx$, existente s numero primo, tum si omnia quadrata per hunc numerum s diuidantur et residua ex singulis enata notentur, inter ea semper occurret $-fg$, siue sublara negatione, $s - fg$.

Demonstratio.

Sint residua illa ex diuisione per s orta, $1, a, b, c, d, \text{etc.}$ ac praebent quadrata x^2 residuum a , quadratum vero yy residuum b , atque eandem est numerum $fa + gb$ per s fore diuisibilem. Sic ergo $fa + gb = \lambda s$, erique $gb = \lambda s - fa$, ideoque $b^2 = \lambda g s - fg a$. Quum iam

F f 3

iam omne residuum, in quadratum ductum, iterum inter residua occurrat, sequidem infra s deprimatur, prodeat inde residuum v , ita ut sit $v = \lambda g s - f g a$, et multiplo ipsius s subtrahat $v = -f g a$, sine $c = s - f g a$, et quia hoc æque valet de omnibus residuis, loco a sumentes unitatem habebimus: $v = -f g$, sine $c = s - f g$.

Corollarium 1.

§. 33. Si ergo satisfaciatur valor $s = b$, quia formula $\pm n f g + b$, si fuerit numerus primus, etiam satisfaciatur pro s , si per hunc numerum omnia quadrata dividantur, inter residua certo occurret $-f g$.

Corollarium 2.

§. 34. Si ille divisor $= D$, et quia datur quadratum, quod sit $p p$, vade nascitur residuum $-f g$, mantestam est formulam $p p + f g$ divisibilem fore per divi-
forem D .

Corollarium 3.

§. 35. Hic autem iam manifeste involuntur distictis illa conditio numeri primi, quia ordo residuorum hic memoratus locum non habet, nisi D sit numerus primus. Fieri enim valde potest, ut $-f g$ non inter residua occurreret, si divisor non esset primus.

Propositio 2.

§. 36. Si quadrata dividendo per quemcumque numerum primum $D = 2 p + 1$ inter residua occurrat numerus r , tunc

tunc eius potestas r^p per D divisam vitiatam relinquet; et vicissim, si $r^p - 1$ divisorem habeat D , numerum r inter residua reperiri necesse est.

Demonstratio.

Quum divisor D ponatur $2 p + 1$, omnium numerorum ipso minorum multitudine est $2 p$, quorum quia semissis tantum in residua ingreditur, multitudine residuorum erit p . Deinde etiam certum est, si inter residua occurrat numerus r , tum quoque omnes eius potestates ibidem occurrere debere, quemadmodum simplicissima $r^0 = 1$ inest. Quocirca potestas r^p necessario novum residuum præbere potest. Arque hinc rite concluditur, inde ipsum primum residuum 1 prodire debere, sicque constat propositam potestatem r^p , per numerum primum D divisam, residuum relinquere $= 1$. Quod ad inversionem propositionis attinet, perpendamus, formulam $r^{2p} - 1$ perpetuo divisibilem esse per $2 p + 1$; ex quo sequitur, vel formulam $r^{2p} - 1$, vel $r^p + 1$ divisibilem esse debere. Omnes ergo numeri pro r sumti, quibus formula possidentur $r^p + 1$ sit divisibilis, ex ordine residuorum excluduntur, atque illi tantum, qui formulam $r^p - 1$ divisibilem producunt, relinquuntur, quorum numerus quam sit p , sequitur omnes numeros r fore residua.

Corollarium 1.

§. 37. Quum primus divisor fuerit $= b$, potestatem $b = 2 p + 1$, et quia $r = -f g$, sequitur, formulam $(-f g)^p - 1$ per $b = 2 p + 1$ esse divisibilem, seu fore $r^p = 1 + m (2 p + 1)$. Quum deinde etiam divisor esse possit

num inter
odest inde
iplo ipsius
in hoc æ-
s vitiatam
quia for-
am satisfi-
drata divi-
datur qua-
f g, mani-
e per divi-
divitur diffi-
duorum hic
rus primus.
inter residua
ne numerum
numerus r ,
tunc

possit $h + 4nf g$, dummodo fuerit numerus primus, ob
 $b = 2p + 1$ faciamus

$$D = 2p + 1 + 4nf g = 2P + 1,$$

ita ut sit $P = p + 2nf g$, atque etiam haec potestas:

$$(-fg)^P = (-fg)^{p+2nf g}$$

unitate minorata per divisoem $2p + 1 + 4nf g$ euadet
divisibilis.

Corollarium 2.

§. 38. Quocirca totum negotium hac redit, ut,
ponendo brevitatis gratia $-fg = r$, ostendatur, si formula
 $r^p - 1$ fuerit divisibilis per $2p + 1$, tum etiam hanc for-
mulam: $r^{p+2nr} - 1$, fore divisibilem per $2p + 1 + 4nr$,
siquidem numerus $2p + 1 + 4nr$ fuerit numerus primus.

Corollarium 3.

§. 39. Si ponamus $r = -1$, evidens est formulam
 $-1^p - 1$, dividi non posse per $2p + 1$, nisi p sit nume-
rus par. Sit ergo $p = 2q + 1$ numerus primus,
tum certe inter residua reperietur $4q$. Sit quadratum, unde
hoc residuum nascitur $= x^2$, et $x^2 + 1$ divisibile erit per $4p + 1$.
Ita ex his rationibus facillime patet, semper dari summam
duorum quadratorum divisibilem per numerum $4q + 1$,
id quod alias per multas demum ambages ostendi solet.

§. 40. Missis autem his, quae principis nondum
satis corroboratis iuntantur, per certa principia in indo-
lem huiusmodi aequationum: $fxx + gyy = s^2z$, accu-
ratus inquiramus. Ac primo quidem iam rigoroze mon-
stravi-

Astravi
sumt
etiam
missio

tum
meru

per b ,
ductur
ita, ut
 x et y
sponte

unde
habebit
haec si
Hoc
consequ
 b , in

tantum
tionem
Eule

mus, ob
tas:

euadet

dit, ut,
formula
anc for-
 $+ 4nr$,
imus.

formulam
nume-
primus,
unde
 $x 4p + 1$,
summam
 $q + 1$,
solet.

nondum
in indo-
2, accu-
se mon-
stravi-

Astravimus, si haec aequatio possibilis fuerit casu $s = b$, tum
fuit numero k , ita ut sit $p^2 + fgq = k^2r$, fore
etiam $s = bk$ valorem idoneum pro s . Hoc igitur prac-
missis ad sequentia progrediamur.

Theorema I.

§. 41. Si aequatio $fxx + gyy = b^2z$ fuerit possibilis,
tum semper assignari potest talis formula: $t + fg$, per nu-
merum b divisibilis, ita ut numerus t minor sit quam b .

Demonstratio.

Quum formula illa $fxx + gyy$ divisibilis sit
per b , si ea ducatur in formulam $fp^2 + gq^2$, etiam pro-
ductum per b erit divisibile. Sumantur ergo numeri p et q
ita, ut sit $py - qx = x$, id quod semper fieri potest, nisi
 x et y habeant communem divisorem, qui autem casus hinc
sponte excluditur; tum autem productum illud erit

$$(fp^2 + gq^2) + fg,$$

unde sumto $t = fp^2 + gq^2$ formula $t + fg$ divisorem
habebit b . Hic autem ponamus $t = \lambda + \mu b$, acque tum
haec formula $\lambda + fg$, etiam nunc per b erit divisibilis.
Hoc vero modo λ infra semissem numeri b deprimetur,
consequenter certo dabitur formula $t + fg$ divisibilis per
 b , in qua t non excedit semissem ipsius b .

Corollarium I.

§. 42. Haec eadem proprietates numeri b , quia
tantum a producto fg pendet, acque patet ad hanc aequa-
tionem: $xx + fgy = b^2z$. Quin etiam, si productum
Euleri Opusc. Anal. Tom. I. G g fg

$f g$ in duos alios factores ζ et η resolvi queat, eamdem conditionem locum habet, ut aequatio $\zeta x x + \eta y y = b z z$ sit possibilis.

Corollarium 2.

§. 43. Quoties ergo numerus b fuerit divisior formulae $t t + f g$, inde non semper concludi potest, aequationem $f x x + g y y = b z z$ esse possibilem, sed plus inde inferri nequit, quam dari formulam aequationem $\zeta x x + \eta y y$ aequalem termino $b z z$, dummodo fuerit $\zeta \eta = f g$.

Corollarium 3.

§. 44. Quia $t < \frac{1}{2} b$ formula $t t + f g$, minor erit quam $\frac{1}{2} b b + f g$, quae ergo si dividatur per b , quotus minor erit quam $\frac{1}{2} b + \frac{f g}{b}$.

Corollarium 4.

§. 45. Vicissim ergo etiam patet, si nulla detur huiusmodi formula per b divisibilis, tum etiam neque hanc aequationem: $f x x + g y y = b z z$, neque ullam aliam ad finem $\zeta x x + \eta y y = b z z$ esse possibilem, si scilicet fuerit $\zeta \eta = f g$. Ad hoc ergo examinandum sufficit eos tantum casus evolvit, quibus $t < \frac{1}{2} b$.

Theorema 2.

§. 46. Si aequatio $f x x + g y y = b z z$ fuerit possibilis, tum semper numerum b' , minorem quam b , exhibere liceat, ita ut haec aequatio: $f x x + g y y = b' z z$, sit possibilis.

Demonstratio.

ant, eamdem
 $y y = b z z$

divisor formulae, aequationem plus inde inferri nequit, quam dari formulam aequationem $\zeta x x + \eta y y = f g$.

minor erit
 b , quotus

nulla detur neque hanc aequationem: $f x x + g y y = b z z$, neque ullam aliam ad finem $\zeta x x + \eta y y = b z z$ esse possibilem, si scilicet fuerit $\zeta \eta = f g$.

it possibilis, tum semper numerum b' , minorem quam b , exhibere liceat, ita ut haec aequatio: $f x x + g y y = b' z z$, sit possibilis.

Demonstratio.

Demonstratio.

Si ponamus formulam $t t + f g = k$, supra iam demonstravimus, etiam hanc formulam: $f x x + g y y = b k z z$ esse possibilem. Modo autem vidimus pro t dari valorem adeo minorem quam $\frac{1}{2} b$, quo formula $t t + f g$ habeat factorem b . Sit ergo alter factor b' ideoque $k = b b'$ et $b k = b b'$, et deleto quadrato $b b$, vtpote in quadrato $z z$ involuendo, orietur aequatio quoque possibilis:

$$f x x + g y y = b' z z, \text{ vbi } b' < \frac{1}{2} b + \frac{f g}{b}.$$

Corollarium 1.

§. 47. Quantuscunque ergo fuerit numerus b' , hoc modo continuo ad minores valores b' , b'' , etc. pervenire licebit, donec tandem numeri prodeant tam parvi, qui vltiorem diminutionem non admittunt. Quia enim $b' < \frac{1}{2} b + \frac{f g}{b}$, vtiqve b' excedere debet $\frac{1}{2} b$; unde manifestum est, quo minor numerus b fuerit reddendus, vltiorem diminutionem retardari, atque adeo penitus fitti.

Corollarium 2.

§. 48. Si, dum hoc modo pro b continuo minores valores eruntur, tandem perveniantur ad valorem vel f , vel g , hinc certo concludere poterimus, aequationem propositam esse possibilem, quandoquidem ista: $f x x + g y y = f z z$ casum maxime obtinuit involuit, scilicet $y = 0$ et $z = x$. Sin autem nullo modo deducamur ad f vel g , sed ad alium numerum ζ , divisorem ipsius $f g$, iudicio id erit, non ipsam aequationem propositam, sed aliam ad finem, scilicet $\zeta x x + \eta y y = b z z$ esse possibilem; unde si tandem adeo

Demonstratio.

perueniretur ad unitatem, tum aequatio $xx + fgyy = bzz$ foret possibilis.

Problema.

§. 49. Propofita aequatione $3xx + gyy = bzz$; inueftigare, vtrum ea fit possibilis nec ne?

Solutio.

Quia hic tres numeri proponuntur, f , g et b , aequatio ita exhibeatur, vt numerus b eorum fit maximus, quandoquidem hic ferinde est, vtrum termini aequationis sint positivi, an negativi. Tum fumatur formula $11 + fg$, et examen inftituatur, vtrum, pro f numeris minoribus quam $\frac{1}{2}b$ fumendis, haec formula fiat diuisibilis per b nec ne? Cafi pofteriore ftatim pronuntiare poterimus, aequationem propofitam eſſe poſſibilem; priore autem caſu loco b nanciſcemur alium numerum minorem b ſimili modo examini ſubiendum, donec tandem vltior diminutio non habeat locum. Et ſi inter hos valores occurrat f vel g , certum hoc erit indicium, aequationem propoſitam eſſe poſſibilem; ſin autem ad alium numerum ζ , diuiſorem producti fg , peruenimus, tum concludemus, aequationem $\zeta \cdot x + \eta yy = bzz$ eſſe poſſibilem, exiſtente $\zeta \eta = fg$. Quodſi autem neutrum vſi veniat, tum in valore minimo, in locum b ſuccedente acquieſcimus, qui fit b , et nunc aequationem $3xx + gyy = bzz$ ita diſponamus, vt litterarum f et g maior, puta g , ad dextram referatur hoc modo: $bzz - fxx = gyy$, et nunc loco g ſimili modo quaeratur g' , donec perueniatur ad g' ſive ipſi b ſive ipſi f aequalem, quo caſu propoſitum noſtrum itidem erit cuius-

enſum
troduc
quatio
tandem
cium :

 $+ fgyy = bzz$

 $+ gyy = bzz$

tactioſi
omnes
laboreſ
cipio :

omnuntur, f , g
us b eorum fit
vtrum termini
m tumatur for-
n, pro f nume-
rmula fiat diui-
im pronuntiare
ſibilem; priore
terum minorem
ic tandem vlti-
er hos valores
n, aequationem ζ
um numerum ζ ,
oncludemus, ac-
xiſtente $\zeta \eta = fg$.
alore minimo in
et nunc aequa-
tus, vt littera-
eratur hoc mo-
do: $bzz - fxx = g$
simili modo
ſive ipſi b ſive
um itidem erit
cuius-

enſum. At ſi ne hoc quidem facile pateſcat, loco g in-
troducamus valorem exiguum inde ortum g' , et nunc ae-
quatio $bzz - g'yy = fxx$ ſimili modo tractetur; ſicque
tandem ad ternos numeros f' , g' , b' peruenietur, vt indi-
cium nulla amplius difficultate laborare poſſit.

Corollarium 1.

§. 50. Si numerus b fuerit praegrediens, vitique
tactioſo calculo erit opus, antequam formulae $11 + fg$
omnes caſus vsque ad $\frac{1}{2}b$ exigantur; vix autem talem
laborem quisquam ſuſcipiet. Admiſſo autem ſuperiore prin-
cipio ſtatim valor iſte b infra $4fg$ deprimitur.

Corollarium 2.

§. 51. Si ingens ille numerus b habeat factores,
puta m et n , hic labor non parum ſubleuabitur, dum pri-
mo talis valor pro f inueſtigatur, vt formula $11 + fg$
ſitrem diuiſibilis fiat vel per m , vel per n ; neque enim
deinceps difficile erit caſum elicere, quo iſta formula per
ipſum numerum b fiat diuiſibilis. De caetero tota haec
operatio exemplis clariuſ illuſtrabitur.

Exemplum 1.

§. 52. Examinanda proponatur haec aequatio :
 $3xx + 5yy = 1007zz$. Sumatur ergo formula $11 + 15$;
ob $f = 3$ et $g = 5$, et quia $b = 1007 = 19 \cdot 53$, quaera-
tur f primo ita $\sqrt{11 + 15}$ ſaltem diuiſorem obtineat 19, quod
maniſeſto fit ſurſumendo $t = 2$; tum enim fit $k = 19$ et ſic pro-
dit $b' = 53$, ſublato quadrato 19². Nunc porro quaeratur f' ,
vt formula $11 + 15$ diuiſorem nanciſcatur 53, quod fit
ſi

$3xx +$
ob $f =$
tur f pr
maniſeſt
dit $b' =$
vt fori

cuius-

§ 3

si $t = 12$, ita ut iam habeamus $k = 159 = 3 \cdot 53$, ideoque $b'k = 3 \cdot 53^2$, sicque $b'' = 3$, qui numerus, quum aequalis sit ipsi f , indicat nostram formulam esse possibilem.

Exemplum 2.

§. 53. Proponatur haec aequatio: $2xx + 7yy = 23 \cdot 22$. Hic $f = 2$, $g = 7$ et $b = 23$. Sumatur $k = 11 + 14$, qui numerus sit divisibilis per 23, sumendo $t = 3$. Erit autem $k = 23$, ideoque $b'k = 23^2$; unde intelligimus, haec aequationem: $xx + 14yy = 23$ esse possibilem; neque vero hinc sequitur propositam esse impossibilem, quum fieri possit ut utraque simul locum habeat. Videamus ergo an haec forma: $2xx + 7yy = 23$ sit possibilis, quod quidem manifestum est, sumendo $x = 1$, $y = 1$ et $z = 3$. Sed tamen regula nostra vramur, et quia est $b' = 1$, sumendo $t = 2$ erit $k = 18 = 2 \cdot 3^2$, hinc $b'k = 2 \cdot 3^3$, ideoque $b'' = 2$ hoc est $b'' = f$, sicque patet etiam ipsam propositam aequationem esse possibilem.

Corollarium.

§. 54. Quum ergo hoc casu utraque forma $fx^2 + gyy = bzz$ et $xx + fgyy = bzz$ sit possibilis, operae pretium erit in eos casus inquirere, quibus utraque formula $fx^2 + gyy$ et $xx + fgyy$ eidem termino bzz aequalis esse possit. Hoc autem manifesto eveniet, quando fieri poterit $fx^2 + gyy = uu + fgw$, quod si evenire possit, insuper certe exhiberi poterunt casus, inter quos dabitur vnus, quo $w = 0$. Illud igitur evenit, quoties enadere potest $fx^2 + gyy = uu$, id quod nostro exemplo manifesto fit.

Exem-

$= 3 \cdot 53$, ideoque $b'' = 3$, qui numerus, quum aequalis sit ipsi f , indicat nostram formulam esse possibilem.

§. 53. Proponatur haec aequatio: $2xx + 7yy = 23 \cdot 22$. Hic $f = 2$, $g = 7$ et $b = 23$. Sumatur $k = 11 + 14$, qui numerus sit divisibilis per 23, sumendo $t = 3$. Erit autem $k = 23$, ideoque $b'k = 23^2$; unde intelligimus, haec aequationem: $xx + 14yy = 23$ esse possibilem; neque vero hinc sequitur propositam esse impossibilem, quum fieri possit ut utraque simul locum habeat. Videamus ergo an haec forma: $2xx + 7yy = 23$ sit possibilis, quod quidem manifestum est, sumendo $x = 1$, $y = 1$ et $z = 3$. Sed tamen regula nostra vramur, et quia est $b' = 1$, sumendo $t = 2$ erit $k = 18 = 2 \cdot 3^2$, hinc $b'k = 2 \cdot 3^3$, ideoque $b'' = 2$ hoc est $b'' = f$, sicque patet etiam ipsam propositam aequationem esse possibilem.

Hic $f = 2$, $g = 7$ et $b = 23$. Sumatur $k = 11 + 14$, qui numerus sit divisibilis per 23, sumendo $t = 3$. Erit autem $k = 23$, ideoque $b'k = 23^2$; unde intelligimus, haec aequationem: $xx + 14yy = 23$ esse possibilem; neque vero hinc sequitur propositam esse impossibilem, quum fieri possit ut utraque simul locum habeat. Videamus ergo an haec forma: $2xx + 7yy = 23$ sit possibilis, quod quidem manifestum est, sumendo $x = 1$, $y = 1$ et $z = 3$. Sed tamen regula nostra vramur, et quia est $b' = 1$, sumendo $t = 2$ erit $k = 18 = 2 \cdot 3^2$, hinc $b'k = 2 \cdot 3^3$, ideoque $b'' = 2$ hoc est $b'' = f$, sicque patet etiam ipsam propositam aequationem esse possibilem.

Exem-

Exemplum 3.

§. 55. Proponatur aequatio $xx + 6yy = 145 \cdot 22 = 5 \cdot 29 \cdot 22$. In formula ergo $k = 11 + 6$ sumamus $t = 2$, ut fiat $k = 2 \cdot 5$, ideoque $b'k = 2 \cdot 5^2 \cdot 29$, sicque $b'' = 2 \cdot 29$. Nunc sumatur t ita, ut k fiat per 29 divisibile, quod evenit sumendo $t = 9$; fiet enim $k = 87 = 3 \cdot 29$, ergo $b'k = 2 \cdot 3 \cdot 29^2$ et $b'' = 6 = 2 \cdot 3$, consequenter nostra aequatio est vitique possibilis.

Exemplum 4.

§. 56. Proponatur aequatio: $3xx + 7yy = 89 \cdot 22$. Hic est $f = 3$, $g = 7$ et $b = 89$, ideoque $k = 11 + 21$. Quaeratur ergo t , ut illa formula divisibilis fiat per 89. Ponamus in hunc finem $t = 84 = 89 \cdot n$. Hic enim loco 21 scribere liceret 21, uu in genere, atque hic sumimus $u = 2$, ut etiam hunc casum illustremus. Quum autem nullum quadratum sit formae $3n + 2$, pro numero n excluduntur valores 1, 4, 7, 10, et in genere $3\alpha + 1$. Deinde excluduntur omnes numeri impariter pares 2, 6, 10, 14, etc. et quia omnia quadrata sunt formae vel $5\alpha + 3$, vel $5\alpha + 4$, pro n etiam excluduntur hi numeri: 3, 4, 8, 9, 13, 14, et in genere $5\alpha + 3$ et $5\alpha + 4$. His exclusis pro n remanent examinandi hi numeri: 5, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 27, 32, 35, 36, 41, quos ergo successively in aequatione $11 = 89 \cdot n - 84$, loco n substitui oportet. At vero primus valor $n = 5$ statim praebet quadratum, unde $k = 5 \cdot 89$ et $b' = 5$. Nunc autem k per 5 fiet divisibile sumendo $t = 1$, unde fit $k = 5 \cdot 17$ et $b'' = 17$. Quia ergo neque ad 3, neque ad 7 pervenimus, sumto $b' = 5$ examinamus aequationem $5xx - 3xx = 7yy$, atque iam tota

ope-

operatio est mutanda, dum habemus $f = 5$, $g = -3$ et $b = 7$, quocirca, posito $k = 11 - 15$, sumamus $t = 1$, ut fiat $k = -2.7$, unde fit $b' = -2$, ita ut nunc aequatio examinanda sit haec $5zz - 3xx = -2yy$, siue $3xx - 2yy = 5zz$, ubi $f = 3$, $g = -2$ et $b = 5$. Sumto ergo $k = 11 - 6$, fiat $t = 1$ erit $k = -5$ et $b' = -1$, ergo pervenimus ad hanc aequationem: $3xx - 2yy = -zz$, siue $2yy - zz = 3xx$, ubi habemus $f = 2$, $g = -1$, $b = 3$. Erit ergo $k = 11 - 2$, quod quum nullo modo fieri possit, omnes istae aequationes ideoque et ipsa proposita sunt impossibiles.

Exemplum 5.

§. 57. Sit proposita aequatio $3xx + 7yy = 178zz$, ubi ut antea $f = 3$, $g = 7$, at $b = 178 = 2.89$, duplo maiori quam casu praecedente. Posito ergo $k = 11 - 21$, ex praecedente patet pro t sumi debere 23. Posito igitur $t = 81. n - 21$ pro n relinquuntur numeri:

5, 8, 9, 14, 18, 20, 24, 29, 30, 33, 38, 44.

Reperitur autem $n = 14$, unde fit $t = 35$, sicque erit $k = 14.89$, hincque $b' = 2.14 = 4.7$, ideoque $b = 7$, qui numerus quum ipsi numero g sit aequalis, indicat aequationem nostram esse possibilem.

Problema.

§. 58. Postquam aequatio $fxx + gyy = bzz$ methodo praecedente possibilis fuerit inuenta, dum tandem valores ex b inveni perducti fuerint ad f , siue ad g , determinare ipsa quadrata xx et yy , quibus aequatio eadem possibilis.

Solu-

Solutio.

Quia solutio praecedens ad sequentes formulas est

perducta:
 $k = aa + fg = b b'$; $k' = bb + fg = b' b'$;

$k'' = cc + fg = b'' b''$; etc.

habebimus $b k = b' b'$; $b'' k'' = b' k' b''$. Si-
 mili modo reperiemus

$b. \square = b'' k'$, item $b'. \square = b'' k''$; etc.

Sit nunc $b''' = f$, erit $b'' = f. b''$, hinc $b' \square = f. k'. k'$, ac tandem $b. \square = f. k. k. k'$, consequenter habebimus $b \square$ hoc est

$bzz = f(aa + fg)(bb + fg)(cc + fg)(dd + fg)$ etc.

quod productum manifesto reducitur ad $f(A^2 + fg B^2)$, ita ut hinc fiat $bzz = f A^2 + ffg B^2$, quocirca nanciscemur $x = A$ et $y = f B$, sicque Problema est resolutum.

per $t = 3$ et $ac-$
 equatio $3xx$
 sumto $er-$
 $- 1$, $er-$
 $= - 2z$,
 $g = - 1$,
 nodo fieri
 proposita
 hab
 mili
 Sit
 tand
 est
 b
 quoc
 ita
 mar

: 178 zz,
 9, duplo
 11 - 21,
 ico igitur

que erit
 $e b' = 7$,
 dicat ac-

$= bzz$
 n tandem
 id g , de-
 rito ena-

Solu-

Enla: